

HIRUDOID FORTE GEL – TUBO 14 G

Hirudoid Forte Gel es un medicamento tópico antiinflamatorio y antitrombótico, formulado con condroitín sulfato de sodio, utilizado para aliviar la inflamación, mejorar la circulación local y tratar hematomas, contusiones, várices superficiales o flebitis. Su presentación en gel permite una rápida absorción sin dejar residuos grasos, ofreciendo efecto local inmediato y acción terapéutica sostenida. Es un producto de uso cutáneo con acción comprobada en el tratamiento de lesiones vasculares superficiales.

FICHA TÉCNICA:

- Presentación: Tubo de 14 gramos
- Forma farmacéutica: Gel transparente, de uso tópico
- Principio activo: Condroitín polisulfato de sodio (50000 U.I./100 g)
- Concentración: 0.5 %
- Vehículo: Gel hidroalcohólico de rápida absorción
- Color: Incoloro o ligeramente amarillento
- Olor: Suave, característico
- Aplicación: Cutánea (uso externo únicamente)
- Registro sanitario: Producto aprobado para uso farmacéutico

BENEFICIOS:

- Reduce rápidamente la inflamación y el dolor local.
- Disminuye hematomas, equimosis y congestión venosa superficial.
- Mejora la microcirculación local y favorece la reabsorción de líquidos extravasados.
- Textura en gel no grasa, que se absorbe rápidamente.



IMAGEN REFERENCIAL

- Seguro para uso prolongado bajo supervisión médica.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Aplicar una capa fina sobre la zona afectada de 2 a 3 veces al día, masajeando suavemente.
- No aplicar sobre heridas abiertas, mucosas ni piel irritada.
- Lavarse las manos antes y después de la aplicación.
- Evitar la exposición directa al sol en la zona tratada después de aplicar el gel.
- No ingerir ni aplicar en ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y conservar en lugar fresco y seco.